



# Directrices COVID-19\*

Se aceptarán tanto la PCR como la prueba rápida. Según los CDC<sup>1</sup>, la vacunación completa se define como dos semanas después de la serie de vacunas Pfizer/Moderna o de la vacuna única J&J COVID-19. Debido a la disponibilidad de las vacunas COVID-19 el Programa de Pruebas Rápidas en el Hogar y las pruebas sintomáticas en la escuela, ya no realizaremos el rastreo de contactos. El regreso al trabajo/escuela es la decisión final de la Oficina de Recursos Humanos y/o Enfermería de TLC.

**Inscríbese en el programa de pruebas rápidas en el hogar**

**Consentimiento para las pruebas sintomáticas en la escuela**

## SINTOMÁTICO:

Si un estudiante o personal tiene uno o más de estos síntomas:

- Fiebre (100.0 F o más)/Escalofríos
- Dificultad para respirar/escasez de aliento
- Pérdida del gusto o del olfato
- Dolores musculares o corporales
- Tos
- Dolor de garganta
- Náuseas, vómitos o diarrea
- Dolor de cabeza
- Fatiga
- Congestión nasal o secreción nasal

### Pueden asistir al trabajo/escuela cuando estén

- No tengan fiebre durante 24 horas sin medicación antifebril
- medicación antifebril;
- tengan una mejora de los síntomas.

**El proveedor médico de la persona puede proporcionar información adicional.**

## SOSPECHA DE EXPOSICIÓN A COVID-19:

Ha estado a menos de 6 pies de una persona con COVID-19 positivo mientras en el interior, durante al menos 15 minutos en un período de 24 horas.

### Exento de la cuarentena:

- Asintomático y totalmente vacunado;
- Ha tenido COVID en los últimos 90 días y asintomático.

### Debe estar en cuarentena:

- Si no está vacunado, no puede volver al trabajo/escuela hasta que
- Esté en cuarentena durante cinco días. Se recomienda realizar la prueba el quinto día.

## PRUEBA POSITIVA PARA COVID-19:

Aislar durante un mínimo de 5 días a partir del inicio de los síntomas O del día en que se realizó la prueba.

Puede asistir a la escuela/trabajo el día 6 siempre y cuando:

- haya mejorado los síntomas;
- Siga llevando una mascarilla durante 5 días más siempre que esté cerca de otras personas;
- No tenga fiebre durante al menos 24 horas sin medicación antifebril.
- medicación antifebril.

Actualizado el 4/2022